



Matgorzata Świątek

INSTYTUT KOSMETOLOGII

PRZECIWSKAZANIA DO ZABIEGÓW Z UŻYCIEM LASERA THE EPI LAB

PRZEDSTAWIONA PONIŻEJ LISTA PRZECIWSKAZAŃ MA NA CELU ZAPEWNIENIA NAJWYŻSZEGO BEZPIECZEŃSTWA ZABIEGU, ALE RÓWNIEŻ UZYSKANIE JAK NAJLEPSZYCH EFEKTÓW DEPILACJI LASEROWEJ.

- Bielactwo, padaczka oraz inne choroby autoimmunologiczne
- Łuszczyca w miejscu zabiegowym
- Guzy i nowotwory (przebyty rak skóry, czerniak złośliwy)
- Aktywne zmiany wirusowe i bakteryjne na skórze objętej zabiegiem - wymagany miesiąc przerwy po wygojeniu infekcji
- Rozrusznik serca, pompa insulinowa (chyba, że lekarz wyda zgodę)
- Cukrzyca nieuregulowana
- Zaburzenia krzepnięcia krwi
- Stosowanie leków obniżających krzepliwość krwi
- Aktywna opryszczka w miejscu zabiegu
- Świeże zabiegi chirurgiczne
- Ciąża, karmienie piersią
- Balsamy brązujące, samoopalające i z drobkami złota (2 tygodnie przed zabiegiem)
- Balsamy, emulsje, kremy z drobkami złota (3-4 tygodnie przed zabiegiem)
- Świeża opalenizna - ale tylko w przypadku poparzenia skóry- pacjent ze skórą czerwoną (czekamy do zbrązowienia skóry ok 2 tygodnie)
- Świeża opalenizna - ale tylko w przypadku poparzenia skóry- pacjent ze skórą czerwoną (czekamy do zbrązowienia skóry ok 2 tygodnie)
- Włosy wydepilowane woskiem, pensetą, depilatorem, kremem do depilacji (3 tygodnie przed zabiegiem)
- Preparaty Retinoidalne oraz kremy z kwasami i substancjami ziołowymi np: krem z nagietka, maści sterydowe (należy zakończyć kurację na 3 tygodnie przed zabiegiem) w miejscu poddanym zabiegowi
- Spożywanie ziół fotouczulających (dziurawiec, nagietek, mieszanki ziołowe np. Skrzypovita, Figura itp.- należy zakończyć przyjmowanie w/w ziół na 2 tygodnie przed zabiegiem)
- Przyjmowanie leków światłoczułych (np. Tetracykliny):
 - antybiotyki (np: tetracykliny, azytromycyna, ciprofloksacyna, kotrymoksazol, nitrofurantoina, doksycyklina, metronidazol)
 - leki homeopatyczne, steroidowe
 - niektóre leki przeciwnadciśnieniowe, nasercowe (amilorid, amiodaron, atenolol, bisoprolol, kaptopryl, diltiazem, enalapryl, enarenal)
 - niektóre leki przeciwcukrzycowe (tolbutamid, glipizyd, metformina, sulfonamidy)
 - tiazydowe środki moczopędne (hydrochlorotiazyd, bendroflumentiazyd, bemetizyd)
 - środki przeciwbólowe (np. ketonal, ibum, ibuprofen, polopiryna, aspiryna, pyralginum i inne , dozwolone Apap, paracetamol)
 - niesteroidowe środki przeciwreumatyczne
 - niektóre środki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne (terbinafina, ketokonazol, gryzeofulwina)
- Zarzycanie doustnych retinoidów - pół roku przed depilacją, wg. wskazań lekarza